

115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代 號：2318

類科名稱：中醫師(二)

科目名稱：中醫臨床醫學(二)(包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學)

考試時間：1小時30分鐘

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.關於咳嗽的敘述，下列何者錯誤？

- A.病因可分為外感與內傷兩大類
- B.外感咳嗽治療原則宜宣肺祛邪，忌用斂肺或補澀之品
- C.臨床上可配合胸部X光以及痰液檢查
- D.辛味入肺，宜食辛辣香燥之品

2.依《醫宗金鑑》，下列有關二陳湯加減之敘述，何者不適當？

- A.熱痰加黃芩、黃連
- B.氣虛有痰加人參、白朮
- C.風痰加南星、製附子
- D.濕痰加蒼朮

3.關於《醫宗必讀·痺》文中的敘述，下列何者最不正確？

- A.治痛痺者，散寒為主，疏風燥濕仍不可缺
- B.治行痺者，散風為主，御寒利濕仍不可廢
- C.治著痺者，利濕為主，祛風解寒亦不可缺
- D.治外者，養正為先；治藏者，散邪為急

4.下列何藥毒性較強，被認為可能有免疫抑制的作用，因而可能對類風濕性關節炎的治療有幫助？

- A.海風藤
- B.雷公藤
- C.絲瓜藤
- D.絡石藤

5.66歲林女士，主訴三日前開始喘咳氣湧，胸部脹痛，痰稠黏色黃，伴有胸中煩熱，渴喜冷飲，舌苔黃膩，脈滑數，治以下列何方最適宜？

- A.桑白皮湯
- B.二陳湯

C. 華蓋散

D. 麻黃湯

6. 65歲鄭女士，罹患右側肺癌與肋膜積液多年，主訴數月前咯吐少量黏痰，口咽乾燥，伴隨右側胸脅悶痛，形體消瘦，診其舌紅，少苔，脈細數，治療此懸飲的處方，下列何者最適宜？

A. 柴枳半夏湯

B. 十棗湯

C. 香附旋覆花湯

D. 沙參麥冬湯

7. 61歲王女士，去年因外感咳喘至急診就診，發現肺炎、肋膜積水及心臟肥大，經治療後出院，但心臟超音波檢查發現左心室射出率17%，嚴重二尖瓣逆流，醫師建議接受心臟移植，病人希望中西醫合治，目前稍動即喘，終日身倦，納差不知飢，稍食即飽脹，大便日三行，質軟散，無腹痛，雙下肢水腫須持續服用利尿劑，常抽筋，眠差需服用安眠藥，面色萎黃，舌胖大淡紅，邊有齒痕，苔白膩，脈沉無力，治以下列何方最適宜？

A. 金匱腎氣丸

B. 實脾散

C. 越婢湯

D. 疏鑿飲子

8. 20歲林姓學生，個性較易緊張，近逢期末考，心悸有漏拍感，納差腹脹，時有噁心感，易腸鳴，大便日行偏軟散，胸脘痞悶，渴不欲飲，午後身倦及下肢腫，眩暈時作，舌淡紅，苔白膩水滑，脈弦滑，下列何證型最適宜？

A. 水飲凌心

B. 心膽氣怯

C. 痰熱擾心

D. 陰虛火旺

9. 關於胃炎若伴隨嘔吐物，下列敘述何者最不適宜？

A. 嘔吐酸水綠水者，多由肝熱犯胃

B. 嘔吐苦水黃水者，多由膽熱犯胃

C. 嘔吐濁痰涎沫者，多屬食積內腐

D. 嘔吐清水者，多因脾胃虛弱

10. 28歲周先生，因胃脘部疼痛至西醫檢查，診斷有胃發炎及幽門螺旋桿菌感染，接受西醫三合一療法中，目前症狀有胃脘疼痛有熱感，口乾口苦，口渴而不欲飲，小便黃，大便不暢，舌苔黃膩，脈滑數。治以下列何方最適宜？

- A.清中湯
- B.一貫煎
- C.左金丸
- D.化肝煎

11. 72歲陳先生，為退休工人，體型消瘦，聲音低弱，語速緩慢，主訴每天清晨約四、五點左右即腹鳴作瀉，排便成糊狀或稀水樣，瀉後感覺腹部舒暢，白天則無腹瀉情形，進食後也無立即腹瀉現象。舌淡，苔白，舌質胖嫩，邊有齒痕，脈沉細無力，治以下列何方最適宜？

- A.黨參、白朮、茯苓、甘草
- B.白朮、白芍、防風、陳皮
- C.補骨脂、吳茱萸、肉豆蔻、五味子
- D.葛根、黃芩、黃連、甘草

12. 47歲林女士，主訴自兩個月前開始出現排便後肛門出血，血色鮮紅，滴滴答答附於糞便後段，不痛。初時不以為意，近期發現便血頻率增加，幾乎每日一次。同時出現頭暈、心悸、面色蒼白、倦怠乏力、月經量少色淡。長期茹素，無便秘史。西醫大腸鏡檢查未見明顯腫瘤或潰瘍，排除重大器質性病變。舌淡苔薄白，脈沉細無力，治以下列何方最適宜？

- A.地榆散
- B.黃土湯
- C.歸脾湯
- D.瀉心湯

13. 38歲王先生，主訴小便短數，解尿時有燒灼感，伴隨刺痛感，小便色黃，伴見腰痛不舒服，口苦，惡心感，便秘，下列何處方治療最適當？

- A.濟生腎氣丸
- B.沉香散
- C.八正散
- D.小蓳飲子

14. 38歲蔡先生，主訴腰痛，自覺腰部沉重感，痛處有熱脹感，另外有小便短赤，脈濡數，苔濁，下列何處方治療最適當？

- A.甘薑苓朮湯
- B.五苓散
- C.五皮飲
- D.二妙散

15. 70歲趙女士，年度健檢已連續3年有異常，尿液檢驗的高倍鏡檢發現紅血球數目約20~30個，病人

身形偏瘦，BMI=17.5，食慾不佳，說話聲音低微，體力差、容易疲倦，常有心悸健忘，睡眠品質不佳，容易多夢，舌淡，脈細弱。下列何證型最適宜？

- A.下焦熱盛
- B.腎虛火旺
- C.脾不統血
- D.腎氣不固

16. 65歲王女士，最近一週解小便時感輕微疼痛，感覺解小便不順暢，小便顏色淡紅，腰痠，下肢痠而無力，精神疲憊，自覺虛弱無力，舌淡紅，脈細數。治以下列何方最適宜？

- A.石葦散
- B.程氏萆薢分清飲
- C.補中益氣湯
- D.知柏地黃丸

17. 70歲孫先生，因小便不暢前來求診，症見小便量少而難出，情緒易怒，長期壓力大，伴隨脇腹脹滿，診其舌紅，苔薄黃，脈弦。下列證型何者最適當？

- A.膀胱濕熱
- B.肺熱壅盛
- C.肝鬱氣滯
- D.脾經濕熱

18. 痿證與痺證雖同屬肢體失用之證，但下列關於兩者的比較何者最適當？

- A.痿證以疼痛為主，痺證多見無力
- B.痺證常有熱象，痿證皆因寒濕
- C.痿證常見肌肉萎縮，痺證以腫痛為多
- D.痺證與氣血虧虛關聯性高，痿證多因外感風邪

19. 35歲林小姐，近兩週因工作壓力大，出現入睡困難與睡眠不穩，常在半夜易醒，醒後難以再入睡。伴隨胸悶、心煩不安，白天頭重目眩、精神不振。患者訴說近來食慾減退，見食即厭，偶感噁心，並有噯氣、吞酸等現象。舌苔黃膩，脈象滑。下列何證型最適當？

- A.痰熱擾心型
- B.心脾兩虛型
- C.陰虛火旺型
- D.心火熾盛型

20. 56歲林先生，2個月前發生出血性中風，目前復健中，無法言語，腰膝痠軟，肢體無力，眩暈耳鳴，心煩失眠，舌紅，苔少，舌體瘦小，脈弦細數，治以下列何方最適宜？

- A.鎮肝熄風湯
- B.滌痰湯
- C.補陽還五湯
- D.地黃飲子

21. 54歲張小姐，近期經過低劑量電腦斷層掃描，進行肺癌的檢查，發現有毛玻璃樣病灶，她這陣子持續性的咳嗽，下列敘述何者最適當？

- A.咳嗽不是很劇烈，但咳嗽發作一段時間，午後黃昏咳嗽加重，多屬肺燥陰虛證的咳嗽
- B.咳嗽時作，白天多於夜間，咳而急劇，聲重，或以咽癢則作咳多，多屬痰熱傷津證的咳嗽
- C.早晨咳嗽陣發加劇，咳嗽連聲重濁，痰出咳減者，多為陰虛證或是氣虛證咳嗽
- D.夜臥咳嗽較劇，持續不已，少氣或伴隨著氣喘者，為久咳致喘的氣火或是痰濕證

22. 36歲張先生，昨天起喉嚨痛，至診所就醫時體溫攝氏38.5度，新冠肺炎快篩陽性，頭脹痛，流鼻涕，咳嗽有痰，痰透明量少質黏，舌紅，苔薄白，脈浮數，治以下列何方最適宜？

- A.荊防敗毒散
- B.銀翹散
- C.新加香薷飲
- D.桑杏湯

23. 19歲陳先生，自幼有支氣管哮喘病史，每逢換季易發作，患者於三日前受寒，出現鼻塞、流清涕、畏寒、咳嗽，次日出現氣喘、胸悶，夜間加重，伴有痰多白稀、咳嗽聲重，需坐臥以喘，夜間睡眠品質下降。曾使用西藥支氣管擴張劑緩解，但仍反覆發作，前來求助中醫治療。就診時舌淡紅，苔白滑，脈浮緊，治以下列何方最適宜？

- A.蘇子降氣湯
- B.定喘湯
- C.小青龍湯
- D.三子養親湯

24. 70歲男性患者，1週前因咳嗽、痰黃量多至急診，當時體溫為38.8℃，接受胸部X光、血液生化檢查等，診為肺炎而收住院，經過抗生素及支持治療1週後，因患者心悸、失眠會診中醫。至病房看患者發現：咳嗽改善很多，剩乾咳無痰，體溫為37℃，白血球及發炎指數已降至正常值，胸部X光已無肺炎表現，但患者自訴會感到心煩、心悸、難入眠、眠則多夢惡夢、微咳無痰，口乾渴，大便乾結，家屬並代答：患者晚上睡覺時會突然大叫驚醒，並且身熱盜汗，視其舌紅，苔薄黃，切其脈細滑數無力，治以下列何方最適宜？

- A.麻黃、杏仁、石膏、甘草、桑白皮、地骨皮、魚腥草
- B.黃連、黃芩、白芍、阿膠、麥門冬、生地黃、炙甘草、雞子黃、酸棗仁

C.人參、黃耆、肉桂、茯苓、茯神、當歸、川芎、半夏、炙甘草、柏子仁、五味子、遠志

D.桔梗、甘草、金銀花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵

25.60歲汪太太，肺心病史近10年，此次因為近1月來心悸、胸悶漸漸加重，故前來就診。並自訴伴隨眠淺易醒，暈眩，脘痞反胃，嘔吐痰涎，納差，口渴不欲飲，小便不利，下肢浮腫，pitting edema(+)，望診其面色不華，舌淡、苔白滑，切其脈弦滑，治以下列何方最適宜？

A.炙甘草湯

B.溫膽湯

C.苓桂朮甘湯

D.桂枝甘草龍骨牡蠣湯

26.60歲蔡先生，高血壓及高膽固醇血症病史近30年，不定時服西藥控制，但近1年有按時服藥，自述胸悶痛近2個月，痛的性質為絞痛，胸痛為陣發性，一次持續30秒左右，用力或爬樓梯容易發作，胸痛發作時放射到肩背部，平素並有胸悶少氣、易疲倦、眠淺易醒，納尚可，二便平，昨日開始持續胸痛無休止，胸痛徹背，背痛徹心，四肢冰冷，喘息不得臥，舌黯紅，苔白滑，脈寸沉遲，關沉緊。治以下列何組方藥最適宜？

A.血府逐瘀湯合生脈散

B.血府逐瘀湯合炙甘草湯

C.栝蒌薤白白酒湯合烏頭赤石脂丸

D.栝蒌薤白半夏湯合薏苡附子散

27.55歲陳太太，有痔瘡病史，患者平素眠差，容易疲倦，有時心悸，飲食量偏少，便軟有時伴隨出血，血色紅或黯紅，舌質淡，脈細。診以下列何證型最適宜？

A.腸道濕熱

B.氣虛不攝

C.脾胃虛寒

D.陰虛火旺

28.65歲蔡女士，因肝炎急性發作住院14天，出院後眼睛黃並沒有改善，故至中醫求診，症見：身目色黃但偏黯，吃不下，吃完飯後腹脹，大便軟散，口淡，身倦，苔白膩濕，質淡，脈沉緩。治以下列何方最適宜？

A.參苓白朮散

B.茵陳朮附湯

C.茵陳蒿湯

D.小柴胡湯

29.34歲沈先生，因為玩滑板跌倒導致右側脅肋挫傷，症見呼吸或咳嗽患處疼痛已2天，大便變硬，口不乾，苔薄白質淡紅，脈弦。治以下列何方最適宜？

- A. 柴胡、當歸、枳實、甘草、紅花、桃仁、大黃
- B. 柴胡、白芍、枳殼、香附、川芎、甘草、陳皮
- C. 延胡索、川楝子
- D. 柴胡、枳實、白芍、甘草、延胡索

30. 一位65歲女性慢性C型肝炎多年，超音波檢查有肝硬化，半年前出現腹大脹滿不舒，甚則青筋暴露，叩診：shifting dullness (+)，捫之灼手，煩熱口苦，渴不欲飲，大便秘結，茶色尿，面目皮膚發黃，舌紅，苔黃膩灰黑，脈弦數。AST：275 IU/L、ALT：146 IU/L、Albumin：2.6 g/dL、T-bilirubin：11.30 mg/dL、Hb：9.6 g/dL。有關其治法，下列何者最適當？

- A. 行濕散滿，疏肝理氣
- B. 攻下逐水，清熱利濕
- C. 涼血化瘀，滋養肝腎
- D. 行氣利水，活血化瘀

31. 承上題，下列何處方治療最適當？

- A. 膈下逐瘀湯合六味地黃丸
- B. 五皮飲合少腹逐瘀湯
- C. 胃苓湯合柴胡疏肝散
- D. 茵陳蒿湯合中滿分消丸

32. 50歲陳先生，最近這個月常覺得四肢困重乏力感，手足浮腫，不太想吃東西，吃完就腹脹，臉色偏白，舌淡胖，苔厚膩偏滑，有齒痕，脈沉細，診下列何證型最適當？

- A. 濁邪犯胃
- B. 邪陷困脾
- C. 脾陽虛
- D. 腎陽虛

33. 80歲男性，神疲，四肢冷，面部及雙眼浮腫，心悸，氣促，小便短少，下肢水腫至足背，按之凹陷難起，舌淡紅，舌體胖大，苔白，脈沉細。下列敘述何者最不適當？

- A. 屬陰水
- B. 發病機制為風水
- C. 水氣上凌心肺
- D. 治療為濟生腎氣丸合真武湯

34. 50歲李女士，罹患紅斑性狼瘡6年，主訴頭痛，項背強直，惡寒發熱無汗3天，肢體酸重，四肢抽搐，舌苔白膩，脈浮緊，以下列何方藥治療最適宜？

- A. 葛根、麻黃、桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗

- B.羌活、獨活、防風、藁本、川芎、炙甘草、蔓荊子
- C.荊芥、防風、羌活、獨活、柴胡、前胡、川芎、枳殼、桔梗、茯苓、甘草、生薑、薄荷
- D.荊芥、連翹、金銀花、桔梗、薄荷、淡竹葉、甘草、淡豆豉、牛蒡子、蘆根
- 35.56歲林女士，診斷為乾燥症候群（Sjögren syndrome, SS），主訴為咽乾鼻燥，口乾欲飲，胃中灼熱，大便乾結，舌紅少津，脈細數，下列何方治療最適合？
- A.百合固金湯
- B.生脈散
- C.益胃湯
- D.涼膈散
- 36.川崎病（Kawasaki disease），已發燒五天以上，皮膚黏膜出疹，結膜充血，手足脫屑，頸部淋巴結腫大為特點的急性發熱性疾病，下列病因病機何者最適當？
- A.風熱犯肺，表衛不固
- B.熱邪熾盛，氣營兩燔
- C.陰虛內熱，虛火上炎
- D.熱入血分，迫血妄行
- 37.關於糖尿病之重病或危候或不治之症之描述，下列何者最不適當？
- A.消病日久，不能食者，末傳中滿鼓脹
- B.小便不臭反作甜氣，在溺桶中滾湧，濺在桶邊如柏燭泪者，此精不禁
- C.飲噉無度，咀嚼鮓醬，不擇酸鹹
- D.消病日久，能食者，末傳腦疽背瘡
- 38.52歲王先生，罹患糖尿病7-8年，因體倦怠身重來就診，近一個月飢不能食，體乏無力，小便清，便溏，舌淡苔白膩，脈弱。血液生化檢查顯示空腹血糖：157 mg/dL，HbA1c：6.8%。下列何病機最適合？
- A.燥熱傷肺
- B.腎虛火亢
- C.脾胃氣虛
- D.陰虛及陽
- 39.承上題，治以下列何方最適宜？
- A.八味地黃丸
- B.消渴方
- C.左歸飲

D.七味白朮散

40. 45歲王小姐，近日因怕冷，易疲勞，水腫，心悸，喘，體重增加就醫，舌淡紅，舌體胖大，苔白，脈沉遲無力。檢驗結果TSH：12 μ IU/mL（0.4-4.0 μ IU/mL），Free T4：0.5 ng/dL（參考值0.7-1.9 ng/dL），total cholesterol：280 mg/dL（參考值130-200 mg/dL）。下列診斷何者最適合？

- A. 急性甲狀腺炎
- B. 甲狀腺功能亢進
- C. 甲狀腺惡性腫瘤
- D. 甲狀腺功能低下

41. 承上題，治以下列何方最適當？

- A. 香砂六君子湯
- B. 五苓散
- C. 濟生腎氣丸
- D. 桂枝茯苓丸

42. 關於失眠辨證之敘述，下列何者最不適當？

- A. 失眠伴隨食慾減退，口淡無味，飯後胃脘脹悶，腹脹，便溏，多屬脾胃病變
- B. 失眠兼具多夢，頭昏，頭痛，健忘等症狀者，其病在肝
- C. 心煩失眠，不易入睡，又有心悸，口舌潰爛，夜半口乾者，多屬陰虛火旺
- D. 入睡後易於驚醒，平時善驚，易怒，常嘆息者，多為心虛膽怯之不寐

43. 56歲羅小姐癲癇發作，症見氣短，四肢抽搐，伴隨頭部和胸脅刺痛，眼眶色青，舌紫黯，脈弦細澀，下列何種證型最適宜？

- A. 肝風痰熱
- B. 肝腎陰虛
- C. 脾胃虛弱
- D. 氣虛血瘀

44. 高血壓是中風好發病因，在中風發病之前，下列何種症狀是最常見的先兆？

- A. 耳鳴
- B. 眩暈
- C. 胸悶
- D. 便秘

45. 36歲張小姐，頭痛已數年，反覆發作，痛處固定似錐刺，舌質偏紫，苔薄白，脈細澀，此證型以下列何者最適宜？

A.血虛頭痛

B.肝陽頭痛

C.腎虛頭痛

D.瘀血頭痛

46. 70歲張先生，膽囊癌手術後復發，近三個月來脅部刺痛明顯，痛有定處，入夜更甚。脅肋下或見癥塊，舌質紫黯，脈象沉澀。治以下列何方最適當？

A.柴胡疏肝散

B.一貫煎

C.龍膽瀉肝湯

D.復元活血湯

47. 58歲沈先生，罹患腫瘤，症見腹脹痛、便秘、納呆的症狀，腹部觸診可壓到有條狀物，重壓疼痛加重，治以六磨湯。若患者痰濕盛，宜加入下列何組藥物最適當？

A.枳實、杏仁

B.陳皮、半夏

C.山楂、萊菔子

D.黨參、黃耆

48. 65歲徐先生，化療後2週突然發生尿痛、頻尿與尿血、小便赤澀，經驗尿並沒有發現尿液感染的跡象，此患者並有口乾渴、欲冷飲，舌尖刺痛感，舌紅有裂紋，脈數，治以下列何方最適當？

A.八正散

B.導赤散

C.清心蓮子飲

D.聖愈湯

49. 下列何者開創婦科沖洗和陰道納藥的先河？

A.《黃帝內經》

B.《婦人良方大全》

C.《金匱要略》

D.《備急千金要方》

50. 婦女若因多囊性卵巢發生不孕，下列何法最適宜治療此疾病之標證？

A.酸甘化陰

B.填補精血

C.祛痰化濕

D.調和營衛

51.一婦女患有子宮黏膜下肌瘤，經量過多且經期延長，伴有心悸，夜間頻尿，腰痠，眠差，舌質淡紅，苔薄白，脈弦細。治以下列何方最為適宜？

A.人參、桂枝、茯苓、丹皮、赤芍、桃仁、麥門冬、五味子

B.當歸、芍藥、川芎、茯苓、白朮、澤瀉、阿膠、仙鶴草、紅棗、黑地榆、五味子、枸杞、芡實、淮山

C.當歸、熟地、芍藥、山藥、黃耆、黨參、升麻、枸杞、炙甘草

D.黃耆、當歸、人參、白朮、白芍、仙鶴草、甘草、生薑、大棗

52.依《金匱要略》，婦人轉胞，不得溺，治以下列何方最為適宜？

A.豬苓湯

B.五苓散

C.腎氣丸

D.當歸芍藥散

53.依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》產後少腹痛證治，因兒枕瘀血者，治以下列何方最為適宜？

A.失笑散

B.佛手散

C.香桂散

D.延胡索散

54.關於產後大便難之辨證論治，下列敘述何者最為適宜？

A.造成產後大便難之病因多為血虛、陰虛、血熱

B.因素體陰虛，或陰虛火盛，內灼津液導致大便難者，可給予腸寧湯《傳青主女科》加玄參、火麻仁

C.由於分娩失血，營血驟虛者，可給予四物湯《婦科心法》加肉蓯蓉、火麻仁、柏子仁、何首烏治療

D.因素體氣虛，分娩出血，致產後氣虛血弱，大腸傳送無力導致大便難者，可給予麻仁丸《經效產寶》加玄參、麥冬、生地

55.關於「天癸」的描述，下列何者最不適當？

A.是腎中精氣充盈的產物

B.天癸至表示月經生理已經完全成熟

C.婦女的月經、胎孕主要與天癸的發生有密切關係

D.七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭

56.30歲患者，因月經前及經行少腹冷痛，腰脊痠痛，喜按，得溫則減，經血量少色淡，夾有血塊，畏寒便溏，苔白膩，脈沉緊，關於此患者的治療，下列何者最為適宜？

- A.當歸三錢、熟地五錢、炒白芍三錢、人參三錢、酸棗仁三錢、炙甘草一錢
- B.白朮五錢、山藥五錢、白扁豆三錢、巴戟肉三錢、白果十粒、蓮子肉四錢、茯苓三錢
- C.當歸三錢、紅花二錢、香附二錢、烏藥二錢、青皮一錢半、木香一錢半、生山楂四錢、澤瀉三錢
- D.人參三錢、山藥四錢、茯苓三錢、當歸三錢、熟地四錢、川芎二錢、白芍三錢
- 57.關於經前乳脹患者，因症狀表現不同而有虛實不同的辨證，下列敘述何者最不適當？
- A.實痛甚者，排卵後即開始脹痛
- B.實證者乳房脹硬而痛；虛證者乳房脹痛而軟
- C.實證較少，虛證為多
- D.實證者常伴煩躁症狀；虛證者常伴腰痠症狀
- 58.下列關於婦科崩漏之敘述，何者最不適宜？
- A.婦人行經之後，淋漓不止，名曰經「漏」；經血忽然大下不止，名曰經「崩」
- B.巢氏《諸病源候論》：「漏下者，由勞傷血氣，衝任之脈虛損故也。」
- C.《金匱要略》：「婦人素有癥病，經斷未及三月，而得漏下不止。胎動在臍上者，為癥瘕害。妊娠六月動者，前三月經水和時，胎也，下血者，後斷三月，衄也。所以血不止者，其癥不去故也，常下其癥，桂枝茯苓丸主之。」
- D.《金匱要略》：「問曰：婦人年五十所，病下利數十日不止，暮即發熱，少腹裏急，腹滿，手掌煩熱，唇口乾燥，何也？師曰：此病屬帶下，何以故？曾經半產，瘀血在少腹不去。何以知之？其證口唇乾燥，故知之，當以當歸芍藥散主之。」
- 59.固陰煎《景岳全書》用來治療下列何種證型的帶下最為適宜？
- A.腎陽虛
- B.腎陰虛
- C.脾陰虛
- D.脾陽虛
- 60.45歲患者，西醫診斷為第2度子宮下垂，由於嚴重程度未達需手術標準，因而尋求中醫治療，經診察患者下腹陰部墜脹，過勞與站立時較嚴重，帶下量多，質稀色白，四肢乏力，少氣懶言，面色少華，小便頻數，舌淡苔薄，脈虛。治以下列何方最為適宜？
- A.炙甘草湯《傷寒論》
- B.補陰益氣煎《景岳全書》
- C.歸脾湯《濟生方》
- D.補中益氣湯《內外傷辨惑論》
- 61.懷孕30週，反覆噁氣吐酸與煩躁易怒，合併胸腹脹滿疼痛，脈象出現弦滑。下列敘述何者最為適宜？

- A. 不可能與食積有關
- B. 治以辛溫香燥與行血理氣之品
- C. 宜當歸芍藥散《金匱要略》治之
- D. 其機理為孕後血聚於下養胎，肝血偏虛，肝氣易鬱，以致胞脈阻滯，因而腹痛
62. 30歲患者，懷孕28週，近日夜間宮縮頻繁，白天腰痠腹墜，陰道出血，頭暈耳鳴，脈沉弱。下列治則何者最適宜？
- A. 先涼血止血為主，後續再固其腎氣
- B. 先補氣止血為主，後續再補其腎精
- C. 固腎益氣同時使用
- D. 以清血熱為主
63. 依《醫宗金鑑·婦科心法要訣》，子嗽發生的原因，下列何者最不適宜？
- A. 感冒風寒
- B. 陰虛火動
- C. 痰飲上逆
- D. 肺腎氣虛
64. 35歲黃小姐，產後乳汁稀少，醫師開立處方：當歸、白芍、熟地、麥冬、柴胡、遠志、通草、白朮、甘草。下列辨證何者最為適宜？
- A. 肝鬱氣滯
- B. 氣血虛弱
- C. 肝胃鬱熱
- D. 痰氣凝結
65. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·四診總括·審病》云：「審兒之病貴詳參，要在安煩苦欲間」，下列敘述何者錯誤？
- A. 晝若煩熱而夜安靜，其病在陽
- B. 喜冷惡熱，皆屬陰病，故為寒也
- C. 耳梢冷，尻骨冷，四肢發冷者，此痘疹欲發之候也
- D. 發熱無汗，此邪在表也；內熱便硬，此邪在裏也
66. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·感冒門·傷寒》，治小兒感冒傷寒初宜九味羌活湯，下列組成何者錯誤？
- A. 蒼朮、白芷
- B. 桑白皮、麥冬

C.黃芩、生地

D.川芎、細辛

67.證見發熱咳嗽，氣急鼻煽，痰涎上壅，甚則涕淚閉塞，張口抬肩，搖身擷肚，屬於下列何種病證？

A.哮喘

B.肺炎喘嗽

C.咳嗽

D.頓咳

68.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》瀉證門：「脾胃濕盛成水瀉，懶食溏瀉色多黃，清濁不分溺短濇」，治以下列何法最適當？①胃苓湯除濕 ②和氣散除濕 ③瀉久不止，訶子散止瀉 ④瀉久不止，升陽除濕湯止瀉

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

69.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》驚風門的記載，驚風搐搦，必神氣昏憤，皆由痰壅氣塞，壅結胸中而致，急用何方吹入鼻內取嚏？

A.撮風散

B.皂角散

C.通關散

D.神功散

70.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，熱淋症見小便不通、淋漓澀痛，治宜十味導赤湯，其組成下列何者正確？①山梔子 ②赤茯苓 ③茵陳蒿 ④車前子 ⑤淡竹葉 ⑥小蘗

A.①②⑥

B.①③⑤

C.①②④

D.③④⑤

71.8歲楊小妹因肢體浮腫由媽媽帶來看診，經問診另有咳嗽、氣急、心悸、胸悶、煩躁不能平臥，望診口唇青紫，指甲發紺，舌苔白膩，脈細數無力。治以下列何方最適宜？

A.參苓白朮散合玉屏風散

B.麻黃連翹赤小豆湯

C.己椒藶黃丸合參附湯

D.溫膽湯合附子瀉心湯

72.關於風痧的敘述，下列何者正確？①一般只傷及肺衛，預後良好恢復較快 ②病程一般可分為初熱、見形、恢復三個階段 ③流行於冬春季節 ④多見於5歲以下的小兒

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

73.關於鵝口瘡之鑑別，下列何者錯誤？

A.嬰兒吐乳後，舌上殘留奶塊，以棉籤輕拭，即可除去凝於舌上之奶塊

B.以棉籤輕拭鵝口瘡，則其白屑不易擦去，且下面的黏膜，見潮紅粗糙

C.白喉假膜多起於扁桃體，漸次蔓延於咽、軟腭或鼻腔等處，其色灰白，不易擦去

D.鵝口瘡通常灼熱疼痛，有淡黃或白色潰瘍面，周圍黏膜紅色

74.6歲女孩，全身皮膚亮黃，臉色黃，鞏膜透黃，有汗，口渴、小便黃，無便秘，腹部無脹滿，依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，治以下列何方最適宜？

A.茵陳蒿、赤苓、豬苓、澤瀉、白朮、肉桂，引用燈心水煎服

B.茵陳蒿、川大黃、梔子，引用燈心水煎服

C.茵陳蒿、麻黃，水煎，加黃酒少許服之

D.附子、乾薑、茵陳蒿、甘草，水煎服

75.5歲男孩發熱約3日，微惡風寒，鼻塞流涕，噴嚏咳嗽，眼瞼紅赤，淚水汪汪，倦怠思睡，舌苔薄白，脈浮數，貼近臼齒處可見細小白色疹點，周圍紅暈，下列敘述何者正確？①病位在肺在表 ②為麻毒閉肺 ③治法以清熱解毒為主 ④以升麻、葛根、連翹治療

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

76.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》瀉證門：「脾虛食後即作瀉，腹滿不渴少精神，面黃懶食肌消瘦」，治以下列何方最適宜？

A.異功散

B.七味白朮散

C.養脾丸

D.參苓白朮散

77.依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣·頭痛門》：「內熱頭痛屬陽明，鼻乾目痛齒頰疼」，治宜下列

何方？

- A. 清空膏
- B. 柴葛解肌湯
- C. 加味茶調散
- D. 葛根湯

78. 依《醫宗金鑑·幼科雜病心法要訣》，關於陰腫之敘述，下列何者正確？

- A. 因邪客於太陰、厥陰之經，濕熱之氣與風冷之氣相搏，氣不得通，故結聚而陰囊腫大
- B. 風盛多癢，濕盛多墜，寒盛多疼
- C. 外腎膚囊腫大，癢痛墜下，宜加味五苓散主之
- D. 偏墜一證，或左或右，睪丸作腫者，宜加味守效丸主之

79. 關於德國麻疹的相關敘述與病程進展，下列何者正確？①先天性德國麻疹可導致嬰兒白內障 ②疫苗可有效預防流行 ③發疹期淋巴腺腫大後開始出現紅疹，四肢最先出現 ④德國麻疹是飛沫或接觸傳染，亦可經胎盤傳染

- A. ③④
- B. 僅①②
- C. 僅②④
- D. ①②④

80. 小兒單純型熱性痙攣（simple febrile seizure），下列敘述何者錯誤？

- A. 發生年齡常見為6個月至5歲
- B. 體溫至少高於38°C
- C. 一般症狀為暫時失去知覺、全身抽搐
- D. 發作時間常超過15分鐘